

粉瘤手術同意書

蔵 皮フ科・形成外科
院長 松川 中

1. 局所麻酔は細い針を用いて行います。
2. トレパンという直径 1～6 ミリの筒状の器具で腫瘍の中心をくり抜き、内容物と袋を摘出します。
3. 手術時間は5～15分です。
4. くり抜いたあとが塞がるのに5～14日を要します。
5. 腫瘍が不規則な形態をしている場合は、腫瘍を大きく切除して縫合することがあります。抜糸は7～14日後です。
6. 炎症を起こしているもしくは炎症の起こっていない粉瘤でも、深いところにある場合は再発する可能性があります。
7. 動作により出血することがありますので、なるべく安静にしてください。
8. 飲酒は出血を助長しますので控えてください。
9. 手術により多少のしこりや瘢痕が残り、体質によって瘢痕が肥厚することがあります。術後経過は個人差があります。経過が思わしくない場合は、すぐにお知らせください。
10. 血液サラサラの薬を服用している場合、中断の可否を主治医にご相談ください。

キトリ

なにかご不明な点やご質問はございますか。 [はい ・ いいえ]

以上の注意事項を十分に理解し、納得した上で治療を受けることに同意します。

年 月 日

カルテNo.

氏名

粉瘤